

## PUNCIÓN-BIOPSIA PROSTÁTICA GUIADA POR ECOGRAFIA

### COMPRAR

- Floxil 200 mg. (ofloxacina) 1 caja x 6 comprimidos **ó** Uniflox 500 mg. (levofloxacina) 1 caja x 7 comprimidos. **Las opciones de antibióticos son a ELECCIÓN, el paciente deberá elegir UNO u OTRO.**
- 1 Enemol.

### PREPARACIÓN

- En caso de estar con tratamiento anticoagulante se debe comunicar, ya que previamente deberá consultar con su médico.
- Suspender el consumo de aspirinas o aspirinetas 3 días antes del estudio.

#### Se necesita para realizar la práctica

- Análisis de coagulación:
  - APP
  - KPTT
  - Tiempo de coagulación

Es condición excluyente el concurrir al estudio con los resultados de los análisis antes mencionados, en caso contrario no se realizará la biopsia.

- Traer el valor de antígeno prostático específico (PSA).
- Tomar 1 comprimido de floxil o uniflox 24 hs antes del estudio.
- Tomar 1 comprimido de floxil o uniflox 12 hs antes del estudio.
- Los comprimidos sobrantes traerlos el día que concurra al estudio, donde se le darán las indicaciones para continuar con los mismos.
- Enemol, colocarlo 3 horas antes del estudio.