

RX ADULTOS • COLON POR ENEMA

Debe tenerse en cuenta que el buen resultado del estudio, está condicionado al estricto cumplimiento de las indicaciones que se detallan a continuación:

Esta preparación no debe ser usada en menores de 15 (quince) años, ni en los siguientes casos:

- Colitis ulcerosa en fase activa de enfermedad, durante el sangrado por hemorragia digestiva.
- No deberá usarse si ha sido recientemente operado de intestino y lleva bolsa de colostomía (ano contranatura).

Después del estudio puede alimentarse normalmente, salvo que su médico de cabecera le hubiera dado dieta. Puede realizar sus tareas habituales.

DEBE CONSULTARNOS:

- Si es muy constipado o toma laxantes habitualmente, si hace más de 48 horas que no elimina gases o materia fecal (sospecha clínica de obstrucción intestinal); si tiene diarrea, mas de 5 (cinco) evacuaciones diarias durante varios días consecutivos.
- Si padece de MIASTENIA GRAVIS debe advertírselo al médico radiólogo antes de la realización del estudio (se utilizará anticolinérgico). Si padece de GLAUCOMA debe consultar a su médico oculista para que le indique la medicación necesaria por cuanto se utilizará anticolinérgico (buscapina) durante el estudio radiológico.
- Si padece de insuficiencia renal o es diabético consulte por esta preparación a su médico.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO

PREPARACIÓN

COMPRAR para la preparación:

- 2 dosis de Fosfo Dom

DIA ANTERIOR AL ESTUDIO:

- Durante la preparación debe ingerir abundante líquido, de modo que nunca tenga sed o la lengua seca por falta de líquidos.
- DESAYUNO ANTES DE LAS 9:00: habitual, abundante, sin restricciones.

A PARTIR DE AHORA DEBE CUMPLIR ESTRICTAMENTE LAS INDICACIONES

- Hora 12:00: té o café, caldo desgrasado (solamente el líquido, sin verduras, fideos, arroz, ni pan, etc), agua, jugo de naranja bien colado con o sin azúcar (sólo el líquido). Seven up o Coca Cola sin gas, Gatorade, gelatina, más solamente **un bife magro de 250 gr. (sin grasa ni pan).**
- A las 14:00 hs. diluir el contenido de un frasco de Fosfo Dom en 450 cc. De agua y beber la mitad de la preparación.
- A las 14:30 hs, beber la mitad restante de la solución de Fosfo Dom.
- A las 19:30 CENA: té o café con azúcar, caldo desgrasado (solamente el líquido, sin verduras, fideos, arroz, ni pan, etc), agua, jugo de naranja bien colado con o sin azúcar (sólo el líquido). Seven up o Coca Cola sin gas, Gatorade, gelatina. **No comer carne de ningún tipo.**
- A las 21:30 hs. diluir el contenido de un frasco de Fosfo Dom en 450 cc. De agua y beber la mitad de la preparación.
- A las 22:00 hs, beber la mitad restante de la solución de Fosfo Dom.

DIA DEL ESTUDIO:

- Desayuno: Solamente Té o café con azúcar hasta 2 (DOS) horas antes del estudio.

TRAER EL DIA DEL ESTUDIO

- Buscapina simple, 2 (DOS) ampollas.
- Gastropaque "F" p/enema, 1 (UNO) sachet
- Jeringa descartable de 5 cc. con aguja descartable E.V. 25/8.
- Una toalla en uso.
- Si el paciente no tiene capacidad de retener el medio de contraste, deberá traer un pañal descartable.

TRAER ESTUDIOS ANTERIORES Y ESTA PREPARACION