

TOMOGRAFÍA DE ABDOMEN Y PELVIS CON CONTRASTE

Antes de comprar los insumos para la preparación y realización del estudio, consultar a las secretarías o a su obra social por la cobertura de los mismos.

PREPARACIÓN

- Al momento de realizarse el estudio deberá tener 7 hs. de ayuno durante el cual, además del contraste, no podrá ingerir nada por boca. No suspender medicación.
- Diluir 20 cc. de Temis TAC (contraste oral) para la tomografía en 800 cc de agua, agregar un sobre de jugo instantáneo (opcional sólo para mejorar el sabor):
 - Si adquiere la ampolla de contraste en farmacia, sólo utilizar 30 cc para diluir en 800 cc de agua, aunque diga "inyectable" lo mismo debe diluirla para tomarla vía oral.
 - Si adquiere la ampolla de contraste en Conci Carpinella, la misma ya tiene la dosificación justa para diluir en los 800 cc. de agua.
- 3 hs. antes del turno, beber 200 cc de la solución.
- 2 hs. antes del turno, beber 200 cc más de la solución.
- 1 hs antes del turno, beber 200 cc del preparado.
- La cantidad restante debe traerla al momento del estudio.

COMPRAR PARA TRAER (antes consultar con la secretaria)

- 2 ampollas de Telebrix C por 50 cc. (si pesa más de 100 Kg., 3 ampollas)
- 2 jeringas de 50 cc. (pico fino)
- 1 Butterfly N° 19 G.

TRAER ESTUDIOS ANTERIORES

Su turno / / a las hs.