

Perfusión Miocárdica Spect Miocárdico

PREPARACIÓN:

Evitar por 24 hs. antes del estudio: té, café, mate, chocolate, gaseosas (almuerzo y cena normales).
Puede desayunar: malta, leche, yogurt.

Día del estudio: • Desayunar y/o almorzar liviano (sin grasas).

Es necesario que CONSULTE CON SU MÉDICO si puede o no suspender la siguiente medicación:

- 7 días antes del estudio: Aspirina.
- 96 hs. antes del estudio: Digitálicos.
- 72 hs. antes del estudio: Diltiazem, Verapamilo, el resto de los bloqueantes cálcicos se deben suspender por 24 hs.
- 48 hs. antes del estudio: Betabloqueantes (Propranolol, Atenolol, Carvedilol, Pindolol, Nebivolol).
- 24 hs. antes del estudio: Propafenona y Bloqueantes cálcicos (excepto Diltiazem y Verapamilo)
- Si es asmático, 24 hs. antes del estudio suspender: Teosona y Aminofilina.

Traer:

- Estudios previos de corazón.
- Lista de medicamentos que toma a la fecha del estudio.
- Fotocopia del pedido médico (Rp). Debe estar aclarado en el pedido si es en reposo, reposo y Esfuerzo o con stress farmacológico (dipiridamol).
- 1 alimento con grasa, puede ser: mantecol, alfajor, sandwich de jamón y queso, etc.)

Duración: Este estudio demora entre 6 y 8 horas.

CONCURRE: DÍA MES HORA.....

IMPORTANTE

- Debe estar aclarado en el pedido si es en reposo, reposo y esfuerzo o con stress farmacológico (dipiridamol).
- Los medicamentos debe suspenderlos siempre y cuando lo haya consultado con el médico que le solicita el estudio. Es muy importante que NO lo suspenda por cuenta propia.
- Venir con ropa deportiva y zapatillas.