

Tomografía de Abdomen

PREPARACIÓN:

- Al momento de realizarse el estudio deberá tener 7 hs. de ayuno durante el cual, además del contraste, NO podrá ingerir nada por boca, excepto su medicación habitual.
- Diluir una ampolla de 25 cc. de **Temistac** en 800 cc. de agua (aunque diga “inyectable” lo mismo debe diluirla para tomarla vía oral), agregar un sobre de jugo instantáneo (opcional, sólo para mejorar el sabor). Si adquiere la ampolla de contraste en Conci Carpinella, la misma ya tiene la dosificación justa para diluir.
- Beber 3 hs. antes del turno, 200 cc. de la solución.
- Beber 2 hs. antes del turno, 200 cc. más de la solución.
- Beber 1 hs. antes del turno, 200 cc. más de la solución.
- Traer el restante de la solución, para ingerirlo durante el estudio.

COMPRAR Y TRAER:

Antes de comprar los insumos para la preparación y realización del estudio, consultar a las secretarías o a su obra social por la cobertura de los mismos

- ampollas de Optiray 350 x 50 ml.
- 1 cateter Abbocath N° 20

IMPORTANTE

- Debe traer el resultado del análisis de creatinina (tiene un mes de validez).
- Si está tomando Metformina, después de la realización del estudio probablemente deba suspenderla.
- El contraste utilizado en Tomografía Computada es IODO por lo tanto es necesario que informe si tiene antecedentes de alergia a este material.
- Debe traer listado de todos los medicamentos que está tomando.
- Debe traer estudios anteriores.

NOTA

La introducción de cualquier sustancia extraña al organismo podría, eventualmente producir reacciones adversas de distinta intensidad. Para este estudio se inyectará un medio de contraste que contiene IODO por vía endovenosa.

Ante cualquier duda consulte a su médico.

CONCURRIR: DÍA MES HORA.....