

COLON POR ENEMA DOBLE CONTRASTE - PEDIATRICO

Preparación:

1. Dieta líquida 48 Hs antes del estudio:
 - Agua mineral sin gas
 - Yogurt u otros Lácteos descremados
 - Té
 - Jugo de naranja o pomelo colado (sin pulpa)
 - Caldo desgrasado
 - Gelatina dietética
2. 36 horas antes del estudio dar sólo los siguientes líquidos :
 - Té
 - Agua mineral sin gas
 - GelatinaLimonada rogé:
 - Niño de 2 a 4 años la mitad de la dosis de 1 limonada.
 - Niño mayor de 4 años 1 dosis completa de la limonada.
3. 24 horas antes del estudio:
 - Continuar con la dieta líquida igual punto 2.Dulcolax gotas:
 - Niño de 4 a 5 años: 5 gotas
 - 6 - 8 años: 7 gotas
 - 8 - 12 años: 10 gotas
 - 12 - 17 años: 20 gotas

Traer:

- Una toalla grande.
- Un paquete de algodón.
- Estudios previos.

Tener en cuenta:

- **No se hace en niños menores de 2 años.**
- Traer al niño, en lo posible, con ropa sin broches metálicos ni botones.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO

Lo esperamos el día / / a las..... Horas.