

## PREPARACIÓN

# Video Colonoscopia con Barex Kit (Mañana)

### SU TURNO

#### Indicaciones para día previo al estudio:

- **10hs.** Prepare el Barex contenido en el Kit (2 frascos con polvo para reconstruir 1 litro de solución con cada uno), de acuerdo a las instrucciones del envase original. Colóquelo en la heladera y resérvelo para iniciar la ingesta por la noche. Puede y debe tomar líquidos, no lácteos (Te, mate, café, aguas saborizadas y caldos bien colados y gelatinas) todo lo que desee hasta 2 horas antes del estudio.
- **12hs.** Carnes rojas o blancas solas. Gelatina de frutas (que no sea de color rojo). Ésta es la última comida sólida antes del examen.
- **16hs.** Tome cuatro comprimidos de Bisacodilo (incluidos en el Barex Kit) con un vaso de agua, sin masticalos. Después de tomar los comprimidos de Bisacodilo, puede tomar la cantidad de líquidos claros no gasificados que desee (agua mineral, aguas saborizadas, caldos colados, mate, té).
- **21hs.** Comience a ingerir el Barex, tomando un vaso grande (de aproximadamente 200 cm<sup>3</sup>) cada 15 minutos, hasta completar la totalidad de la solución (2 litros). Es mejor ingerir el vaso completo, rápidamente, en lugar de tomar pequeñas cantidades en forma continua.

**RECUERDE :** Debe tomar abundantes líquidos, no lácteos (Te, mate, café, aguas saborizadas y caldos bien colados y gelatinas) todo lo que desee hasta 2 horas antes del estudio.

- No es necesario suspender ningún tipo de medicación excepto el HIERRO.
- Si es diabético y está medicado con hipoglucemiantes, o tiene insuficiencia renal o cardíaca, debe consultar previamente a su médico de cabecera.
- Si está tomando medicación antiagregante o anticoagulante (ver drogas -principios activos - citados a continuación) debe consultar con su médico clínico, cardiólogo o hematólogo que indique por escrito cuando suspenderla y cuando reincorporarla luego del estudio. Y si usted se encuentra apto para realizar estudios diagnósticos y/o terapéuticos.

**ANTIAGREGANTES:** CLOPIDOGREL, ASPIRINA, PRASUGREL. **ANTICOAGULANTES:** WARFARINA, ACENOCUMAROL, RIVAROXABAN, DABIGATRAN **OTROS ANTIAGREGANTES:** TICLOPIDINA, DIPIRIDAMOL, TIROFIBAN, EPTIFIBATIDE, ABCIXIMAB

• No podrá conducir vehículos ni maquinarias y no podrá realizar tareas de responsabilidad ni tomar decisiones importantes luego del estudio por lo que deberá concurrir acompañado.

• Si usted sufre de constipación o tiene colostomía (ano contra natura) o sabe que presenta una anatomía diferente, debe consultar a su médico o a nuestro equipo para adecuar la preparación a su caso.

**CONCURRIR: FECHA** ..... **HORA:** ..... (presentarse 30 min. antes)

## IMPORTANTE

- Suspender aspirinas y/o anticoagulantes 7 días previos al estudio (consulte con su médico).
- Informar al profesional si Ud. es diabético, tiene insuficiencia cardíaca o renal, si toma anticoagulantes o si está embarazada.
- REALIZAR Y TRAER :
  - Electrocardiograma con valoración cardiovascular.
  - Laboratorio de coagulación (APP, KPTT, plaquetas)
- Traer estudios previos.
- Asistir acompañado.
- No conducir luego del estudio.
- Traer leído y firmado el consentimiento.