

## PREPARACIÓN

# Video Colonoscopia con Barex Kit luego de las 16

### INDICACIÓN DÍA ANTERIOR

- **10:00 hs desayuno**

Horas Te + galletas de agua.

PUEDE Y DEBE tomar líquidos, no lácteos (Te, mate, café, aguas saborizadas y caldos bien colados y gelatinas) todo lo que desee hasta 2 horas antes del estudio.

- **12 hs almuerzo.** Carnes rojas o blancas solas. Gelatina de frutas (que no sea de color rojo). Ésta es la última comida sólida antes del examen.

- **16 horas merienda.** Te + galletas de agua.

- **22 hs.** Tome cuatro comprimidos de Bisacodilo (incluidos en el Barex Kit) con un vaso de agua, sin masticarlos.

Después de tomar los comprimidos de Bisacodilo, puede tomar la cantidad de líquidos claros no gasificados que desee (agua mineral, Gatorade de pomelo, caldos colados, mate, té).

- **23 hs.** Prepare el Barex contenido en el Kit (2 frascos con polvo para reconstruir 1 litro de solución con cada uno), de acuerdo a las instrucciones del envase original.

Colóquelo en la heladera y resérvelo para iniciar la ingesta por la MAÑANA.

### INDICACIÓN DÍA DEL ESTUDIO

- **10 hs** Comience a ingerir el Barex, tomando un vaso grande (de aproximadamente 200 cm<sup>3</sup>) cada 15 minutos, hasta completar la totalidad de la solución (2 litros).

Es mejor ingerir el vaso completo, rápidamente, en lugar de tomar pequeñas cantidades en forma continua.

### RECUERDE

DEBE tomar abundantes líquidos, no lácteos (Te, mate, café, aguas saborizadas y caldos bien colados y gelatinas) todo lo que desee hasta 2 horas antes del estudio.

- No es necesario suspender ningún tipo de medicación excepto el HIERRO.

- Si es diabético y está medicado con hipoglucemiantes, o tiene insuficiencia renal o cardíaca, debe consultar previamente a su médico de cabecera.

- Si está tomando medicación antiagregante o anticoagulante (ver drogas -principios activos - citados a continuación) debe consultar con su médico clínico, cardiólogo o hematólogo que indique por ESCRITO cuándo suspenderla y cuándo reincorporarla luego del estudio. Y si usted se encuentra apto para realizar estudios diagnósticos y/o terapéuticos.

**ANTIAGREGANTES:** CLOPIDOGREL, ASPIRINA, PRASUGREL. **ANTICOAGULANTES:** WARFARINA, ACENOCUMAROL, RIVAROXABAN, DABIGATRAN OTROS ANTIAGREGANTES: TICLOPIDINA, DIPIRIDAMOL, TIROFIBAN, EPTIFIBATIDE, ABCIXIMAB

- No podrá conducir vehículos ni maquinarias y no podrá realizar tareas de responsabilidad ni tomar decisiones importantes luego del estudio por lo que deberá concurrir acompañado.
- Si usted sufre de constipación o tiene colostomía (ano contra natura) o sabe que presenta una anatomía diferente, debe consultar a su médico o a nuestro equipo para adecuar la preparación a su caso.

## IMPORTANTE

- Suspender aspirinas y/o anticoagulantes 7 días previos al estudio (consulte con su médico)
- Informar al profesional si Ud. es diabético, tiene insuficiencia cardíaca o renal, si toma anti-coagulantes o si esta embarazada
- REALIZAR Y TRAER:
  - Electrocardiograma con valoración cardiovascular.
  - Laboratorio de coagulación (APP, KPTT, plaquetas)
- Traer estudios previos.
- Traer un toallón.
- Asistir acompañado.
- No conducir luego del estudio.
- Traer leído y firmado el consentimiento.
- Traer 2 fotocopias del pedido médico y 2 fotocopias del carnet.